

Заросший участок?



Проблема: различные сорняки

- делают участок неухоженным
- являются источником распространения болезней растений
- способствуют появлению змей и клещей



Торнадо® экстра

Известный гербицид сплошного действия
с новой усиленной формулой

С нами расти легче

avgust crop protection

Горячая линия (звонок по России бесплатный): 8 800 700 03 57, dacha.avgust.com

500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль)

Высококонцентрированный препарат против всех видов сорняков

- Уничтожает всю растительность на площади обработки
- Активен против большинства сорных растений, таких как бодяк, борщевик, пырей, сныть, подорожник, крапива, амброзия и др.
- Ускоренно поглощается листьями и надземными частями сорняков, переносится к точкам роста побегов и корневищ, способствуя быстрой гибели сорной растительности
- Эффект от действия препарата заметен уже через 7-10 дней после обработки в виде остановки роста и пожелтения верхушек побегов
- Полная гибель нежелательной растительности наступает спустя 1-3 недели в зависимости от вида сорняков и погодных условий



Применение: опрыскивание сорных растений рабочей жидкостью препарата в период вегетации. Для приготовления рабочей жидкости в резервуар опрыскивателя налить небольшое количество чистой воды (примерно 1 л), добавить необходимое количество препарата и тщательно взболтать до получения однородной эмульсии. Далее долить воду до необходимого объема и еще раз тщательно взболтать. Рабочая жидкость должна быть использована в день приготовления.

Культура, обрабатыв. объект	Вредный объект	Норма расхода препарата	Способ, время обработки, особенности применения
Участки, предназначенные под посев газонных трав	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	30 мл/3 л воды	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 14 дней до посева газонных культур. Расход рабочей жидкости: 3 л/100 м ²
	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. борщевик и другие злостные сорняки	40 мл/3 л воды	
Участки, не предназначенные под посев (посадку) культурных растений (обочины дорог, вдоль изгороди и т. д.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т. ч. борщевик и другие злостные сорняки	30-50 мл/3 л воды	Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости: 3 л/100 м ²
	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность		